



Poglavlje 18: enoli, enolati i aldolna kondenzacija


α -vodonik u karbonilnim jedinjenjima je kiseo!!!



Deprotonovanje karbonilnih jedinjenja





Deprotonovanje karbonilnih jedinjenja



Poređenje: eten (44); etin (25)


Baze za deprotonovanje:

KH, LDA




enolat iz acetona

Sinteza enolata



Reaktivnost: ambidentni napad enolata preko O ili C:

Ambidentno ponašanje enolatnog jona cikloheksanona




alkilovanje
(termodinamički)

protonovanje
(kinetički)

Keto-enolna ravnoteža


Enol se uravnotežuje sa svojim keto-oblikom u kiseloj ili baznoj sredini



“Keto oblik”

“Enolni oblik”

$$K \ll 1$$




propanon
(aceton)

2-propenol


CH_3 stabilizuje keto oblik

Mehanizam tautomerizacije enola u keton (i obrnuto):

Bazno-katalizovano:




Kiselo-katalizovano



Potvrda za enolizaciju:

H-D izmena sa D₂O, D⁺, or D₂O, ·OD
(α-H signali se gube!!!).

Izmena vodonik-deuterijum




Vežba 18-3

Formulišite mehanizme bazno- i kiselo-katalizovane zamene jednog α -vodonika iz propanona deuterijumom iz D_2O .


Vežba 18-4

Napišite proizvode (ukoliko ih ima) ugradnje deuterijuma dejstvom D_2O -NaOD na data jedinjenja.




Vežba 18-6

Pri tretiranju bazom, biciklički keton A se brzo uravnotežuje sa svojim stereoizomerom, a keton B ne. Objasnite.




Ostale posledice enolizacije: promena stereohemije na α -ugljeniku

Racemizacija optički aktivnog 3-fenil-2-butanona




Bazno-katalizovana izomerizacija α -supstituisanog ketona




Halogenovanje aldehida i ketona

u kiseloj ili baznoj sredini

Kiselo-katalizovano:




Bazno-katalizovano:




Mehanizam: kiselo-katalizovanog α -halogenovanja ketona



FAZA 1. Enolizacija (korak koji određuje brzinu)



FAZA 2. Napad halogena




FAZA 3. Deprotonovanje




Br supstituent smanjuje baznost kiseonika i na taj način usporava dalje halogenovanje

Halogenovanje usporava enolizaciju



Bazno-katalizovano halogenovanje



Kiseliji od
nesupstituisanog
ketona

Br kao supstituent povećava kiselost α -H i ubrzava dalje halogenovanje!!!!


Vežba 18-7

Napišite proizvode kiselo- i bazno-katalizovanog bromovanja cikliheksanona.


Haloformska reakcija: test na metil-ketone

Bazono-katalizovano halogenovanje metil-ketona vrši se i dalje od potpunog halogenovanja metil-grupe. Trihalogenmetil-supstituent je odlazeća grupa, i krajnji proizvod je karboksilna kiselina i trihalogenmetan. Ovaj proces zove se *haloformska reakcija*.


Kada je jod u pitanju, trijodmetan (jodoform) se izdvaja kao žuti talog. Izdvajanje jodoforma, *jodoformska reakcija* je kvalitativni test na



Mehanizam haloformske reakcije




Jodoformska reakcija



Uzgred, jodoform je dezinfekciono sredstvo za spoljašnju upotrebu. Nekadašnji karakterističan miris „na bolnicu“, poznat starijim generacijama, poticao je od jodoforma zbog njegove raširene upotrebe.


Alkilovanje aldehida i ketona




Alkilovanje enolata se teško kontroliše:

1. Enolatni jon je jaka baza: E_2 problems
 - Alkilovanje se najbolje izvodi sa Me-X , primarnim alkil-halogenidima i alilnim halogenidima
2. Enolatni jon veoma lako napada aldehyde: aldolna kondenzacija
 - ketoni su manje reaktivni
3. Problem sa ketonima:
 - polialkilovane
 - regiohemija (nesimetrični ketoni)

Proizvodi alkilovanja 2-metilcikloheksanona



Samo jedan α -H
Dobar alkilujći agens





Reakcija alkilovanja preko enamina

Alternativni način za alkilovanje
aldehida i ketona:

Enamini su neutralni, a C=C veza je elektron-bogata.


β -ugljenik je nukleofilan

Rezonancija kod enamina




Postupak:

1. Formiranje enamina sa npr. azaciklopentanom (pirolidin)
 2. Akilovanje
 3. Kisela hidroliza




Primer:



Wežba 18-10

Predložite mehanizam poslednje faze prikazane reakcije: hidrolize iminium-soli.


Reakcija sa aldehidima:




Enolati aldehida reaguju sa svojim prekursorima i daju proizvode aldolne kondenzacije

Vežba 18-11

Alkilovanje enolata ketona A vrlo je teško zaustaviti pre nego što dođe do dialkilovanja, kako je to dalje prikazano. Pokažite kako biste enamin iskoristili za sintezu monoalkilovanog ketona B.




1. LDA, THF
2. BrCH₂CO₂C₂H₅



Aldolna kondenzacija


(Aldehid+alkohol = aldol)




Stereohemija zavisi od
supstituenata

Primer za katalitičku aldolnu kondenzaciju:

postupno:




U jednom koraku:




Mehanizam formiranja aldola


FAZA 1. Nastajanje enolata



FAZA 2. Nukleofilni napad




FAZA 3. Protonovanje



Dehidratacija aldola:





Mehanizam dehidratacije




“ukrštené” aldolne reakcije...

A+B=

AA+BB+AB+BA




...neenolizabilni aldehidi:




Ketoni podležu aldolnoj kondenzaciji:

Nastajanje aldola iz propanona (acetona)




94%




6%

4-hidroksi-4-metil-2-pentanon




Egzotermno \downarrow $\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \Delta$



80%




4-metil-3-penten-2-on

jedan od reaktanata ne sadrži
enolizabilni vodonik:





Vežba 18-16

Prikažite verovatne proizvode sledećih aldolnih kondenzacija:



Intramolekulska aldolna reakcija





62%




heksandial

1-ciklopentenkarbaldehid


Intramolekulska aldolna reakcija



Bredtovo pravilo





Forbidden norbornene isomers




Vežba 18-17

Predvidite ishod intramolekulske aldolne kondenzacije navedenih jedinjenja.

(a) ciklodekan-1,5-dion



(d) 2,7-oktandion





2-(3-oksobutil)cikloheksanon

Vežba 18-18


Intramolekulska aldolna kondenzacija 2-(3-oksobutil)cikloheksanona (na margini) teorijski može dati četiri različita jedinjenja (zanemarujući stereohemiju). Nacrtajte ih i predložite najverovatniji proizvod. (Pomoć: sastavite model.)

Vežba 18-19

Sintetizujte sledeća jedinjenja iz bilo kog polaznog materijala, koristeći aldolnu kondenzaciju u ključnoj fazi. (Pomoć: za poslednju sintezu neophodna je dvostruka aldolna adicija.)



α,β -nezasićeni aldehidi i ketoni



dobijanje


1. α -halogenovanje-eliminacija

2. oksidacija alilnih alkohola



3. Aldolna kondenzacija



4. Wittig-ova reakcija stabilizovani ilidi



Osobine α,β -nezasićenih karbonila

Stabilizacija rezonancijom


Rezonancioni oblici 2-butenala



posledice:

β, γ -nezasićeni sistemi se premeštaju
u α, β -enone



Izomerizacija β, γ -nezasićenih karbonilnih jedinjenja
u konjugovane sisteme



Kiselo i bazno katalizovana reakcija!


Mehanizam:

Kiselo-katalizovana reakcija



Bazno-katalizovana reakcija


Mehanizam bazno-katalizovane izomerizacije β,γ -nezasićenih karbonilnih jedinjenja






Reaktivnost α,β -nezasićenih karbonila

podležu reakcijama karakterističnim za alkene i ketone/aldehyde

1,2-adicija polarnog reagensa A-B na konjugovani enon




primeri:




1,4-Adicija (kao kod diena)


1,4-adicija polarnog reagensa **A–B** na konjugovani enon



1. Konjugovana adicija H-CN



↓ KCN, H⁺





67%

4-okso-4-fenil-
-butanonitril



Ne nastaje proizvod
1,2-adicije

Mehanizam:


1. protonovanje



2. napad cijanida




2. enol-keto tautomerija




2. O i N nukleofil


a. H_2O ili ROH : konjugovana hidratacija
ili formiranje etara







Mehanizam bazno-katalizovane hidratacije
 α,β -nezasićenih aldehida i ketona




Formiranje etara: Woodward sinteza strihnina






b. Adicija amina, RNHR': Aminacija




Intramolekulska aminacija



3. Adicija organometala


RLi reagensi napadaju samo C=O

1,2-adicija organolitijumovih reagenasa




kuprati, R₂CuLi, 1,4-adicija

Primer dobijanja organokuprata





Primer 1,4-adicije sa kupratima:

1,4-adicija litijum-organokuprata



Početni enolat u 1,4-adiciji kuprata se može „uhvatiti“ pomoću R-X: Dvostruko alkilovanje C=C veze!

α,β -dialkilovanje nezasićenih karbonilnih jedinjenja




4. Enolatni jon kao nukleofil

Enolati napadaju α,β -nezasićene aldehyde i ketone (1,4-adicija): Michael-ova adicija




Mehanizam Michael/ove reakcije





Robinson-ova anelacija



Michael-ova adicija + intramolekulska
aldolna kondenzacija



Michael-ova adicija za kojom sledi intramolekulska aldolna kondenzacija



Primena u sintezi steroida:



VEŽBANJA ZA KOLOKVIJUM

Vežba 18-1

Identifikujte najkiselije vodonikove atome u svakom od zadatih molekula. Napišite strukturu enolatnog jona koji nastaje deprotonovanjem. (a) acetaldehid; (b) propanal; (c) propanon; (d) 4-heptanon; (e) ciklopentanon.

Vežba 18-2

Navedite proizvode reakcije enolata cikloheksanona sa (a) jodetanom (C-alkilovanje) i (b) hlortrimetilsilanom, $(CH_3)_3Si-Cl$ (O-sililovanje).

Vežba 18-3


Formulišite mehanizme bazno- i kiselo-katalizovane zamene jednog α -vodonika iz propanona deuterijumom iz D_2O .

Vežba 18-4

Napišite proizvode (ukoliko ih ima) ugradnje deuterijuma dejstvom $D_2O-NaOD$ na data jedinjenja.


- (a) cikloheptanon
- (c) 3,3-dimetil-2-butanon

- (b) 2,2-dimetilpropanal



Vežba 18-6

Pri tretiranju bazom, biciklički keton A se brzo uravnotežuje sa svojim stereoizomerom, a keton B ne. Objasnite.




Vežba 18-7



Napišite proizvode kiselo- i bazno-katalizovanog bromovanja cikliheksanona.

Vežba 18-11

Alkilovanje enolata ketona A vrlo je teško zaustaviti pre nego što dođe do dialkilovanja, kako je to dalje prikazano. Pokažite kako biste enamin iskoristili za sintezu monoalkilovanog ketona B.



1. LDA, THF
2. BrCH₂CO₂C₂H₅





Vežba 18-8

U reakciji jedinjenja prikazanog na margini sa bazom, nastaju tri izomerna proizvoda C₈H₁₂O. Koji su to? (Pomoć: pokušajte sa intramolekulskim alkilovanjem.) **A**

Vežba 18-9

C-alkilovanje enolata cikloheksanona pomoću 3-hlorpropena (odeljak 18-1) vrši se znatno brže od odgovarajuće reakcije sa 1-hlorpropanom. Objasnite. (Pomoć: videti odeljak 14-3.) Koji proizvod (koje proizvode) biste očekivali u reakciji enolata cikloheksanona sa (a) 2--bromopropanom i (b) 2-brom-2-metilpropanom? (Pomoć: videti poglavlje 7.)




Vežba 18-10


Predložite mehanizam poslednje faze prikazane reakcije: hidrolize iminijum-soli.

Vežba 18-11

Alkilovanje enolata ketona A vrlo je teško zaustaviti pre nego što dođe do dialkilovanja, kako je to dalje prikazano. Pokažite kako biste enamin iskoristili za sintezu monoalkilovanog ketona B.



1. LDA, THF
2. $\text{BrCH}_2\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$



Vežba 18-12

Napišite strukturu hidroksialdehidnog proizvoda aldolne reakcije na 5°C svakog od navedenih aldehida: (a) propanala; (b) butanala; (c) 2-fenilacetaldehida i (d) 3-fenilpropanala.

Vežba 18-13

Može li benzaldehid stupiti u reakciju aldolne kondenzacije? Zašto da ili zašto ne?

Vežba 18-14



Napišite strukturu α,β -nezasićenog aldehidnog proizvoda aldolne kondenzacije na višoj temperaturi svakog aldehida iz vežbe 18-12.

Vežba 18-15

Formulišite mehanizam aldolne adicije propanona. Ovaj proces je reverzibilan. Predložite mehanizam konverzije 4-hidroksi-4-metil-2-pantanona u propanon u prisustvu OH^- , što je primer *retro-aldolne reakcije*.


Vežba 18-16

Prikažite verovatne proizvode sledećih aldolnih kondenzacija:

- (a)  + CH_3CHO
- (b) 2  (reaguje sam sa sobom)
- (c) $\text{CH}_2=\text{CHCHO} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$


Vežba 18-17

Predvidite ishod intramolekulskih aldolnih kondenzacija navedenih jedinjenja.

- (a) ciklodekan-1,5-dion
- (b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$
- (c) 
- (d) 2,7-oktandion

Vežba 18-18



Intramolekulska aldolna kondenzacija 2-(3-oksobutil)cikloheksanona (na margini) teorijski može dati četiri različita jedinjenja (zanemarujući stereohemiju). Nacrtajte ih i predložite najverovatniji proizvod. (Pomoć: sastavite model.)



2-(3-oksobutil)cikloheksanon

Vežba 18-19

Sintetizujte sledeća jedinjenja iz bilo kog polaznog materijala, koristeći aldolnu kondenzaciju u ključnoj fazi. (Pomoć: za poslednju sintezu neophodna je dvostruka aldolna adicija.)



Vežba 18-20

Predložite mehanizam kiselo-katalizovane izomerizacije 3-butenala u 2-butenala. (Pomoć: intermedijer je 1,3-butadien-1-ol.)

Vežba 18-21

Predložite sintezu 3-fenil-2-metil-1-propanola polazeći od propanala.

Vežba 18-22



Tretiranjem 3-hlor-2-cikloheksenona natrijum-metoksidom u metanolu dobija se 3-metoksi-2-cikloheksenon. Napišite mehanizam ove reakcije. (Pomoć: krenite od konjugovane adicije.)

Vežba 18-23

Predložite mehanizam kiselo-katalizovane 1,4-adicije cijanida na 1-fenilpropenon (margin).




Vežba 18-24

Pokažite kako biste sintetisali navedena jedinjenja iz 3-metil-2-cikloheksenona.




Vežba 18-25

Predložite sinteze datih jedinjenja Michael-ovim ili Robinson-ovim reakcijama.











18-27. Robinson-ova anelacija je moćan postupak za građenje šestočlanih prstenova. Stoga nije iznenadujuće da je naširoko korišćen u sintezama steroida. Polazeći od bicikličnog ketona prikazanog na margini, predložite sintezu datog steroida koristeći jednu ili više Robinson-ovih anelacija.






PRIMERI ZADATAKA ZA ISPIT

28. Podvucite α -ugljenikov i zaokružite α -vodonikov atom u svakoj od sledećih struktura.




29. Napišite strukture svakog enola i enolatnog jona koji mogu nastati iz karbonilnih jedinjenja navedenih u zadatku 28.
30. Koji se proizvodi dobijaju iz svih karbonilnih jedinjenja iz zadatka 28, kada se na njih deluje (a) alkalnom D_2O ; (b) 1 ekvivalentom Br_2 u sirćetnoj kiselini; (c) viškom Cl_2 u razblaženoj bazi.




31. Opišite najpovoljnije eksperimentalne uslove za efikasnu sintezu navedenih jedinjenja iz odgovarajućih nehalogenovanih ketona.




32. Predložite mehanizam sledeće reakcije. [Pomoć: uzmite u obzir sve proizvode koji nastaju i bazirajte svoj odgovor na osnovu mehanizma kiselo-katalizovanog bromovanja propanova (acetona) prikazanog u odeljku 18-3.]



33. Napišite očekivani proizvod (očekivane proizvode) reakcije 3-pantanona i 1 ekvivalenta LDA, a zatim adicije 1 ekvivalenta







34. Napišite proizvod(e) datih reakcija.



35. Problem mono- i dvostrukog alkilovanja ketona pomoću jodmetana i baze naveden je u odeljku 18-4. Napišite detaljan mehanizam kojim ćete prikazati da do dvostrukog alkilovanja dolazi i kada se upotrebi samo jedan ekvivalent jodida i baze. Navedite razlog zašto je postupak alkilovanja enaminom rešenje za ovaj problem.
38. Napišite strukture proizvoda aldolne kondenzacije (a) pentanala; (b) 3-metilbutanala; (c) ciklopantanona.
39. Napišite strukture proizvoda koje očekujete kao glavne u ukrštenoj aldolnoj kondenzaciji benzaldehida (u višku) i datih jedinjenja na povišenoj temperaturi: (a) 1-feniletanon (acetofenon – strukturu videti u odeljku 17-1); (b) propanon (aceton); (c) 2,2-dimetilciklopantanon.

41. Napišite verovatne proizvode svake od sledećih aldolnih adicija.



42. Napišite sve moguće proizvode bazno-katalizovane aldolne reakcije svakog od datih parova. (Pomoć: u svakom primeru dobija se više proizvoda; uzmite u obzir termodinamički povoljne i nepovoljne.)




(a) Butanal i acetaldehid

(b) 2,2-dimetilpropanal i acetofenon

(c) benzaldehid i 2-butanon

43. Za svaku reakciju datu u zadatku 42 naznačite koji proizvod će se dobiti u najvećoj količini (ukoliko očekujete takvu selektivnost) i zbog čega.





46. Sveža salata može sadržavati sledeća jedinjenja: 2-heksenal (aroma paradajza), 3-okten-2-on (ukus gljiva) i 2-nonenal i 2,4-nonadienal (ukus i aroma krastavaca). Da li neko od ovih jedinjenja može da se dobije aldolnom kondenzacijom? Ako može, naznačite koje i predstavite sintezu.
47. Napišite glavni proizvod reakcije svakog od jedinjenja (i)-(iii) sa svakim od reagenasa (a)-(h).



- (a) H_2 , Pd, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (c) Cl_2 , CCl_4
- (e) CH_3Li , $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{O}$
- (g) $\text{NH}_2\text{NHC}\overset{\parallel}{\text{O}}\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$


- (b) LiAlH_4 , $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{O}$
- (d) KCN , H^+ , H_2O
- (f) $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{CuLi}$, THF
- (h) $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{CuLi}$, a zatim dejstvo $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$
u THF

49. Napišite proizvode svake reakcije posle obrade vodom.







- (e) Napišite kakve rezultate očekujete kao posledicu dejstva baze na proizvode reakcija
(c) i (d).


50. Napišite krajnje proizvode sledećih reakcija:



51. Predložite sinteze navedenih jedinjenja koristeći Michael-ove adicije, a potom aldolne kondenzacije (tj., Robinson-ovu anelaciju). Svako od prikazanih jedinjenja bilo je korisno u jednoj ili više totalnih sinteza steroidnih hormona.






52. Da li očekujete da se na dvostruku vezu 3-buten-2-ona (prikazan na margini) HCl adira prema Markovnikov-ljevom pravilu? Objasnite vaš odgovor razmatrajući mehanizam reakcije.



ZADACI SA ISPITA

7. Predložite sinteze datih jedinjenja aldolnim, Michael-ovim ili Robinson-ovim reakcijama:





9. Napišite glavni proizvod reakcije 2-cikloheksenona sa sledećim reagensima:

- a) H₂, Pd, CH₃CH₂OH b) LiAlH₄, (CH₃CH₂)₂O c) (CH₃CH₂CH₂)₂CuLi

8. Sveža salata može sadržavati sledeća jedinjenja: 2-heksenal (aroma paradajza), 3-okten-2-on (ukus gljiva) i 2-nonenal (ukus i aroma krastavca). Da li neko od ovih jedinjenja može da se dobije aldolnom kondenzacijom? Ako može naznačite koje i predstavite sintezu.

9. Napišite krajnje proizvode sledećih reakcija:




7. α,β -Nezasićeni aldehidi i ketoni u nekim sličajevima imaju osobine grupa koje ih grade, dok se u drugim ponašaju kao jedinstvena celina. Prikažite reakcije 2-cikloheksenona sa sledećim reagensima:

a) H ₂ , Pd, etanol	d) LiAlH ₄ , etar
b) CH ₃ Li, etar	e) (CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ CuLi, THF
c) NH ₂ OH	f) KCN, H ⁺ , H ₂ O


8. Napišite reakcije aldolne samokondenzacije a) acetaldehyda i b) 3-pantanona na povišenoj temperaturi. c) Predstavite detaljan mehanizam reakcije sa 3-pantanonom.

8. Opisite kako biste dobili sledeća jedinjenja aldolnom kondenzacijom:


a)





b)




9. Predložite postupke kojima se mogu izvršiti sledeće konverzije (potrebno više od jedne faze):



8. Napišite očekivane proizvode sledećih reakcija:



7. Predložite efikasnu sintezu svakog navedenog molekula polazeći od datih polaznih materijala:




7. Napišite strukture proizvoda koje očekujete kao glavne u ukrštenoj aldolnoj kondenzaciji benzaldehida (u višku) i datih jedinjenja na povišenoj temperaturi:

a) 1-feniletanon (acetofenon)


b) propanon (aceton)

9. Predložite eksperimentalne uslove za dobijanje navedenih jedinjenja iz nehalogenovanih ketona:

a)



b)




5. Koji se proizvodi dobijaju u reakciji 3,3-dimetilbutanala sa:


- a) alkalnom D_2O b) 1 ekvivalent Br_2 u sirćetnoj kiselini c) viškom Cl_2 u razblaženoj bazi

6. Napišite verovatne proizvode svake od sledećih aldolnih rakačija, koje se odvijaju na povišenoj temperaturi:

a)



b)



c)

